1) a) $0 \le y \le 1$, $y^2 \le x \le y^{1/3} \iff 0 \le x \le 1$, $x^{1/3} \le y \le \sqrt{x}$; $\int_0^1 \int_{y^2}^{y^{1/3}} y e^{x^2} dx dy = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} y e^{x^2} dy dx = \int_0^1 \frac{x-x^3}{2} e^{x^2} dx =$ $x^2 = t$, $2x\,dx = dt$

$= \int_0^1 \frac{1-t}{2} e^t dt = \frac{1}{2}\left[e^t - te^t + e^t\right]_{t=0}^{1} = \frac{e-2}{2}$

b) Ha $f:[K,\infty) \to [0,\infty)$ csökkenő, akkor $\sum_{n=K}^{\infty} f(n)$ konv. $\iff \int_K^{\infty} f$ konv. cupr. int. és

$\int_{n+1}^{\infty} f \le S - S_n \le \int_n^{\infty} f$, ha $n \ge K$

2) $r(t) = (\sin t, 2, \cos t)$, $0 \le t \le 2\pi$, $\int_L f\,dr = \int_0^{2\pi} f(r(t)) \dot r(t)\,dt = \int_0^{2\pi} (8\sin t, 4\sin^2 t, -8\sin^2 t)(\cos t, 0, -\sin t)\,dt$

$= \int_0^{2\pi} (8\sin t\cos t + 8\underbrace{\sin^2 t}_{\sin t(1-\cos^2 t)})\,dt = \left[4\sin^2 t - 8\cos t + \frac{8}{3}\cos^3 t\right]_0^{2\pi} = 0$

3) a) $\operatorname{rot}(r\underline{a}) = \operatorname{grad}(r) \times \underline{a} + r \underbrace{\operatorname{rot} a}_{0} = \frac{\underline{r} \times \underline{a}}{r} = \frac{(a_3 y - a_2 z, a_1 z - a_3 x, a_2 x - a_1 y)}{r}$

$\underline{r} \times \underline{a} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x & y & z \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = (a_3 y - a_2 z, a_1 z - a_3 x, a_2 x - a_1 y)$

$\operatorname{rot}(r^2 \underline{a}) = \underbrace{\operatorname{grad}(r^2)}_{(2x, 2y, 2z)} \times \underline{a} = \cancel{2} \cdot \frac{\underline{r} \times \underline{a}}{\cancel{r}}$

b) a 0_f helyen pl.-ja $\exists A_1, \dots, A_d \in \mathbb{R}$, hogy $f(x) - f(a) - \sum_{i=1}^{d} A_i (x_i - a_i) = r(x)$ olyan, hogy $\lim_{x \to a} \frac{r(x)}{|x-a|} = 0$

4) a) $r(x,y) = (x, y, \frac{16-y^2}{4})$, $0 \le x \le 1$, $|y| \le 4$ (mert $z \ge 0$)

$r'_x \times r'_y = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{y}{2} \end{vmatrix} = (0, \frac{y}{2}, 1)$, $|r'_x \times r'_y| = \sqrt{1 + \frac{y^2}{4}}$, ami 1

$\int_\Gamma f\,|dr| = \int_0^1 \int_{-4}^{4} f(r(x,y)) |r'_x \times r'_y|\,dy\,dx = \int_0^1 \int_{-4}^{4} x \underbrace{\sqrt{y^2+4}\sqrt{1+\frac{y^2}{4}}}_{\frac{1}{2}(y^2+4)}\,dy\,dx = \int_0^1 \frac{x}{2}\,dx \cdot 2\int_0^4 (y^2+4)\,dy =$

$= \frac{1}{2}\left[\frac{y^3}{3} + 4y\right]_0^4 = \frac{1}{2}\left(\frac{64}{3} + 16\right)$

b) $\operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$, $x \in \mathbb{R}$

5) a) $Az\ x^2 + y^2 + z^2 = 3$ gömbfelület $z \ge 0$ része (gömbi koordinátákkal)

b) L az $x^2 + y^2 = 3$, $z = 0$ vízszintes síkbeli kör, $r(t) = (\sqrt{3}\cos t, \sqrt{3}\sin t, 0)$, $0 \le t \le 2\pi$

$\int_F \operatorname{rot} f\,dF = \int_L f\,dr = \int_0^{2\pi} f(r(t)) \dot r(t)\,dt = \int_0^{2\pi} (3\sqrt{3}\sin t, 5 - 2\sqrt{3}\cos t, -2)(-\sqrt{3}\sin t, \sqrt{3}\cos t, 0)\,dt =$

$= \int_0^{2\pi} (-9\underbrace{\sin^2 t}_{S=\pi} + 5\sqrt{3}\underbrace{\cos t}_{S=0} - 6\underbrace{\cos^2 t}_{S=\pi})\,dt = -15\pi$

6) a) $\operatorname{div}(f \operatorname{grad} f) = \underbrace{|\operatorname{grad} f|^2}_{} + f \underbrace{\operatorname{div}\operatorname{grad} f}_{\Delta f = 0}$ miatt a Gauss-Ostrogradszkij t. miatt

$\int_\Gamma f \operatorname{grad} f\,dF = \int_V |\operatorname{grad} f|^2\,dV \ge 0$

b) $|\Gamma| = \int_A \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2}\,d(x,y)$, $A = D_f \subset \mathbb{R}^2$