1° a) $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} = \int_{x^2+y^2\le 1}\frac{2}{(1+x^2+y^2)^2}d(x,y) = \int_0^1\int_0^{2\pi}\frac{2r}{(1+r^2)^2}d\varphi\,dr = 2\pi\left[\frac{-1}{1+r^2}\right]_0^1 = 2\pi\left(1-\frac{1}{2}\right) = \pi$

b) Ha $a_n \ge 0$ $\forall n$, akkor $S_n$ monoton nő, ezért $\sum a_n$ konv. $\Leftrightarrow$ $S_n$ korlátos

2° $\oint_L f\,dr = \int_T (f'_{1x} - f'_{1y})\,d\bar{T} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}(-x^2)\,dy\,dx = -2\int_{-1}^{1}x^2\,dx = -2\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1} = -\frac{4}{3}$

3° a) $\Phi'_x = 2xy - z \Rightarrow \Phi = x^2y - xz + c(y,z) \Rightarrow \Phi'_y = x^2 + c'_y = x^2 + z \Rightarrow \Phi = x^2y - xz + yz + c(z)$

$\Phi'_z = -x + y + c'(z) = -x + y \Rightarrow c' = \text{const} \Rightarrow \Phi = x^2y - xz + yz + \text{const}$

b) Alakjai nyílt halmaz ívvonalai zárt halmaz metszete nyílt.

4° $r(x,y) = (x, y, \sqrt{1-y^2})$, $0 \le x \le 1$, $-1 \le y \le 1$, $r'_x \times r'_y = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-y}{\sqrt{1-y^2}} \end{vmatrix} =$

$= \left(0, \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, 1\right)$, $n_3 \ge 0$ OK. $\int_F f\,dF = \int_A f(r(x,y))\,r'_x \times r'_y\,dA =$

$= \int_0^1\int_{-1}^{1}(0, y\sqrt{1-y^2}, 1-y^2)\left(0, \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, 1\right)dy\,dx = \int_0^1\int_{-1}^{1}(y^2+1-y^2)\,dy\,dx = |A| = 2$

$(x)\ (y)$

5° a) $F$ az $x^2 + \frac{y^2}{4} \le 1$, $z = 1$ felület, $n = (0,0,1)$, $\operatorname{rot} f = \begin{vmatrix} \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ x^2 & 2x & z^2 \end{vmatrix} = (0,0,2)$

$\oint_L f\,dr = \int_F \operatorname{rot} f\,dF = \int 2\,|dF| = 2|F| = 2\cdot\pi\cdot 1\cdot 2 = 4\pi$ (az a, b féltengelű ellipszis területe $\pi ab$)

b) $f: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ folytonosan deriválható $a \in \mathbb{R}^d$-ben, $\det f'(a) \ne 0$. Akkor $\exists\, a \in U \subset \mathbb{R}^d$, $f(a) \in V \subset \mathbb{R}^d$ nyílt halmazok, hogy $f: U \to V$ bijekció, $f^{-1}$ deriválható $f(a)$-ban és $(f^{-1})'(f(a)) = (f'(a))^{-1}$

6° a) $x^2 + y^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ gömbfelület




b) $\int_F \operatorname{rot} f\,dF = \int_V \underbrace{\operatorname{div}(\operatorname{rot} f)}_{0}\,dV = 0$

↑ Gauss–Ostrogradszkij